

# Hvalpesyge 2013/2014



Foto: DTU Veterinærinstituttet

Dyrlægerne Bjarne Petersen vet-team Peder Elbek Lvk  
og Søren Selsing Bindslev Dyrehospital





# Hvalpesyge

- Paramyxovirus
- Hundesyge
- Udskilles med udåndingsluft, spyt og gødning.
- Kan være vindbåren flere hundrede m.
- Ræv , Hund
- Sunde smittebærere
- Inkubationstid fra mindre end 1 uge til flere uger.
- Influenzasygdom:
- Feber og nedsat appetit
- Flåd fra øjne og næsehule – skorper
- Væske hud og poter
- Angribes hjernen ses kramper
- Diarre og lungebetændelse.
- Udbrud i uvac. Farme
- Giver høj dødelighed
- Optil 70 % hvalpe

# Hvalpesyge/Bekæmpelse

---

- Ingen effekt af medicinering
- Forebyggelse : Vaccination.
- Hvalpe efter uvaccinerede tæver kan vaccineres ved 8-9 ugers alder.
- Hvalpe efter Vintervaccinerede avlsdyr
- Kan vaccineres ved 10 ugers alder.

# Hvalpesyge

## ○ Behandling

- Kan ikke behandles
- Følgeinfektioner behandles med antibiotika

## ○ Forebyggelse

- Vaccination
- Smittebeskyttelse



# Omfangshegn mod RÆVE m.m.



# Moderne anlæg

