



## VET-TEAM SPECIALPRAKSIS FOR SVIN OG MINK

Anne Ovesen  
Anni Arvad Andersen  
Bjarne Petersen  
Gerben Hoornborg  
Jessie Kristoffersen  
Lene Thorup  
Lise Lotte Koldsø Pedersen  
Marianne Søkilde  
Mette Gade  
Søren Christiansen  
Thomas Hansen

LAVHEDEVEJ 28 A  
7500 HOLSTEBRO

TLF. 70 25 74 70  
FAX 70 25 74 71

[WWW.VET-TEAM.DK](http://WWW.VET-TEAM.DK)

### I dette nummer:

- *Efterårsjævnøgn sætter gang i mink*
- *Hannerne dominerer*
- *Ekstra vitaminer*
- *Husk beskæftigelse*
- *Smitsom lungebetændelse*

## Efterårsjævnøgn sætter gang i mink

Minkens liv er styret af lysets påvirkning og deres hormonproduktion starter, når dagene bliver kortere. De kommende måneder vil minkene undergå en kønsmodning, de bliver voksne hvilket kan resultere i nogen uro blandt dyrene. Husk ekstra opmærksomhed, så eventuelle bidskader opdages og håndteres hurtigt og korrekt.

Tirsdag den 23. september, var det efterårsjævnøgn og hermed startskuddet til minkenes kønsmodning, hvilket betyder at der er en øget risiko for uro og bidskader blandt minkene.

## Hannerne dominerer

Inden kønsmodningen er der rimelig ro i minkfarmen, men så snart hormonerne påvirker - især hannerne, kan der opstå uro og heraf mulighed for bidskader og da hannerne er betydelig større end tæverne kan leg pludselig udvikle sig til småskrammer, hvorfor man bør være ekstra opmærksom på minkene og tilse dem regelmæssigt. Forekommer bidskader, er det vigtigt, at minken bliver sat ind i et tomt bur og behandlet efter dyrlægens vejledning, så det bliver helet igen.

## Ekstra vitaminer - en mulighed

Nogle avlere har god effekt ved at tilsætter ekstra vitaminer, for at undgå problemer. E-vitamin er for eksempel anvendelig til at fastholde et velfungerende immunsystem, måske med nogen effekt overfor fedtlever, hvis der er fodret lidt for kraftigt.

B-vitaminer kan ligeledes have en positiv indvirkning på mavesundheden. Generelt indeholder foderet den rigtige mængde vitaminer - så det er en individuel betragtning der gør, om der skal tilsættes ekstra vitaminer, tag en snak med dyrlægen.

## Husk Beskæftigelse

Man kan forebygge ved at sørge for, at minkene er beskæftiget i endnu højere grad end vanligt i den kommende tid. Det kan eventuelt være en halmbriket i buret, så de har noget at lege med. Ligeledes er



det vigtigt at der er tilpas med foder. Minkene er indtil nu blevet fodret godt, for at få så god en størrelse og især længde.

Længdevæksten ophører omkring den 25.

september, hvorefter fodermængden bør reduceres, men altså ikke for meget de skal ikke være sultne, så opstår der unødigt uro, mængden af foder er en balancegang, fodres dyrene for godt, øges risikoen for fedtlever, som minken i sidste ende dør af.

## Smitsom lungebetændelse

Smitsom lungebetændelse ses oftest i oktober og november og skyldes bakterien *Pseudomonas aeruginosa*. Bakterien kan befinde sig i jord og vandsystemet, eller den kan overføres gennem luften.

Kommer bakterien ind i minken - udvikles der smitsom lungebetændelse og minken dør hurtigt.

Symptomerne er blod eller blodigt skum fra næse og mund, ligesom de smittede og ofte døde dyr findes tæt på hinanden.

Hvis de smittede dyr er mere spredt på farmen, er der oftest tale om enten influenza eller lungeinfektion med colibakterier.

Det er yderst vigtigt med hurtig kontakt til dyrlæge, hvis omtalte symptomer ses på farmen.

Der er gode muligheder for både at medicinere og vaccinere dyrene, hvad man vælger afhænger af tidspunktet for udbruddet.

